

**CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO / 2017**

Grupo Alvo	Idade	BCG	Hepatite B	Rotavirus VORH	Penta (DTP+Hib+Hep B)	DTP	VIP e VOP	Pneumo 10	Meningo C	Febre Amarela	Tríplice Viral	Tetra Viral	Hepatite A	HPV	Dupla Adulto	dTpa (adulto)
<b>Protege contra</b>		Formas graves da tuberculose	Hepatite B	Rotavírus	Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Difteria, tétano e coqueluche	Poliomielite	Pneumonia, Otite, Meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i>	Febre Amarela	Sarampo caxumba e rubéola	Sarampo caxumba rubéola e varicela	Hepatite A	HPV	Difteria e tétano	Difteria, tétano e coqueluche
<b>Criança</b>	Ao nascer	Dose Única	Dose ao nascer													
	2 meses			1ª dose	1ª dose		1ª dose (com VIP)	1ª dose								
	3 meses								1ª dose							
	4 meses			2ª dose	2ª dose		2ª dose (com VIP)	2ª dose								
	5 meses								2ª dose							
	6 meses				3ª dose		3ª dose (com VIP)									
	9 meses									Dose Única (1)						
	12 meses							Reforço (2)	1º Reforço (2)		1ª dose					
	15 meses					1º Reforço	1º Reforço (com VOP)					Dose Única (2)	Dose Única (2)			
	4 anos					2º Reforço	2º Reforço (com VOP)									
	9 anos													2 doses (6)		
<b>Adolescente</b>	10 a 19 anos		3 doses (3)						2º Reforço entre 12 e 13 anos de idade (4)		2 doses (3)			2 doses (7)	3 doses, reforço a cada 10 anos (3)	
<b>Adulto</b>	20 a 59 anos		3 doses (3)								2 doses até 29 anos e 1 dose de 30 a 49 anos (3) e (5)				3 doses, reforço a cada 10 anos (3)	Profissional de Saúde 1 dose e 1 reforço a cada 10 anos (8)
<b>Idoso</b>	60anos ou mais		3 doses (3)												3 doses, reforço a cada 10 anos (3)	
<b>Gestante</b>			3 doses (3)												2 doses (3)	1 dose a cada gestação (9)

(1) Até 59 anos ; (2) Até 4 anos; (3) A depender da situação vacinal, completar esquema; (4) Para adolescentes de ambos os sexos de 12 a 13 anos; (5) Profissionais da saúde devem receber duas doses independente da faixa etária; (6) Para meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, 2 doses: 0, 6 meses, a depender da situação vacinal; (7) Adolescente e adultos de 9 a 26 anos portadores de HIV/AIDS em 3 doses, 0, 2 e 6 meses; (8) Como complemento do esquema da vacina dT: Parteiras tradicionais e profissionais de saúde que atuam em maternidade e unidade de internação neonatal (UTI/UCI convencional e UCI canguru) atendendo recém-nascidos e bebês (anestesiista, ginecologista, neonatologista, obstetra, pediatra, enfermeiro e técnico de enfermagem); (9) Entre 20ª semana gestacional a 45 dias após o parto.